



**Dr. PAOLO BRUSCHELLI**

*Spec. Chirurgia Generale ed Anestesiologia – primario chirurgo emerito*

*Esperto in Biorisonanza – Sat-terapia (terapia per la riprogrammazione funzionale organo specifica)  
Socio della Società Italiana di Terapia Chelante – oscillazione molecolare - idrocolonerapia*

**RACCOMANDAZIONI PER MEDICAZIONE DELLA CISTI  
PILONIDALE OPERATA**

**✚ INDOSSARE GUANTI DI LATTICE**

✚ scoprire il sito dalla medicazione fermata dai cerotti

✚ estrarre con movimento continuo e non veloce lo zaffo, che potrà presentarsi impregnato di liquido biologico. Tale aspetto è assolutamente normale nelle prime medicazioni in quanto trattasi di liquidi di necrosi dei tessuti sottoposti al congelamento. Il tampone potrebbe emanare un cattivo odore (normale) e deve essere smaltito possibilmente, all'interno di un sacchetto di plastica se la medicazione di effettua a domicilio, o nei raccoglitori speciali se si effettua in ambulatorio medico ( il sanitario saprà come comportarsi).

**LA FERITA:**

alle prime medicazioni potrebbe mostrarsi una colorazione nerastra dei bordi ( necrosi) e la presenza di qualche pelo (cosa non frequente ma possibile).

Queste manifestazioni sono **NORMALI** e possono presentarsi per due o tre medicazioni.

**NON VANNO GRATTATE VIA!!**

(Il fondo potrebbe sanguinare inutilmente )

VANNO DELICATAMENTE ASCIUGATE CON GARZA STERILE.

LA FERITA VA ASPERSA CON SOLUZIONE FISIOLGICA

**( NON UTILIZZARE ACQUA OSSIGENATA O  
MEDICAMENTI VARI)**

**ISTILLARE QUALCHE GOCCIA DI RIFOCIN TOPICO oppure  
MEDICARE CON GENTALIN CREMA**

ZAFFARE CON DELICATEZZA SENZA FORZARE ( lo zaffo deve servire a drenare il fondo e non deve essere compresso)

Dopo 4 settimane controllo in studio

Per info [bruschelli@libero.it](mailto:bruschelli@libero.it) 0733 866978 848 800 171 3884770378

Dr. Paolo Bruschelli